

Türkisch

Korunma aksiliklerinde yardım



My choice of pharmaceuticals





Önemli bilgiler

YUMURTLAMA VE GEBELİK

Yumurtlama (ovülasyon) terimi, olgun ve döllenme sağlayabilen yumurtanın yumurtalıktan salınımı için kullanılır. Ardından bu yumurta, yumurta kanallarından geçerek rahme ulaşır.

Yumurta bu sürede

- **döllenirse** rahmin mukozasına yerleşir. Gebelik başlar.
- **döllenmezse** birkaç gün içinde regl kanaması başlar ve yumurta bununla birlikte dışarı atılır.

Yumurta, 24 saat kadar döllenme sağlayabilir, erkek döl hücreleri (sperm) bir kadının vücudunda beş güne kadar canlı kalabilir. Bu nedenle, yumurtlama öncesindeki korunmasız cinsel ilişkide de gebelik ile sonuçlanabilir.

Yumurtlama zamanı kadından kadına ancak aynı zamanda aylık döngüden aylık döngüye fark gösterebilir.

Döngünün kaçınıcı gününde olursa olsun kaza nedeniyle istenmeyen gebelik yaşanmasının birçok nedeni vardır. *Acil doğum kontrol hapının zamanında alımı* bu durumları genellikle önleyebilir (bakınız soru 3 ve 5).


Kaza mı oldu? Sakin olun!

Kondom mı yırtıldı? Hap almayı mı unuttunuz? Bu herkesin başına gelebilir. Bu tür istisnai durumlarda *acil doğum kontrol hapı* (*ertesi gün hapı olarak da bilinir*) istenmeyen gebelikleri önlemek için kullanılabilir.

Korunma araçları seçeneklerinin çokluğuna ve bunların özenli kullanımına rağmen, örneğin kondomun kayması gibi bir korunma kazası meydana gelebilir. Bu durumda utanmamalı ya da endişelenmemelisiniz. Bu durumla sorumluluk bilinciyle hareket etmeniz önemlidir. Elinizdeki bu broşürde size destek olacak acil durumda korunma ile ilgili önemli bilgiler bulabilirsiniz.

1 Acil doğum kontrol hapı nedir ve nasıl etki eder?

Acil doğum kontrol hapı, korunmasız cinsel ilişki sonrası acil durumda korunma sağlayan bir araçtır. Bu tür bir kazadan sonra istenmeyen bir gebeliğin önlenmesi için *acil doğum kontrol hapı* yardımcı olabilir. Erkek döl hücrelerinin döllene sağlamayana kadar yumurtlamayı geciktirme prensibiyle etki eder. Böylece yumurtlama söz konusu olmaz ve sonucunda gebelik gerçekleşmez. *Acil doğum kontrol hapları* 2015 yılından bu yana reçetesiz olarak eczanelerden alınabilmektedir.



2 Ne tür acil doğum kontrol hapları vardır ve aralarındaki fark nedir?

Levonorgestrel ya da Ulipristal asetat etken maddeli *acil doğum kontrol hapları* mevcuttur. Bu iki etken maddesi arasındaki fark etki süreleridir. Korunma kazasından sonra Levonorgestrel üç güne kadar, Ulipristal asetat ise beş güne kadar alınabilir.

3 Acil doğum kontrol hapi ne zaman alınmalıdır?

Genel olarak řu geçerlidir: Ne kadar erken o kadar iyi! Levonorgestrel etken maddesi içeren acil doğum kontrol hapi, tercihen korunmasız cinsel ilişkiden sonraki ilk 12 saat içinde alınmalıdır ve 72 saat (3 gün) geçtikten sonra kesinlikle kullanılmamalıdır. Ulipristal asetat etken maddesi içeren *acil doğum kontrol hapi* da korunmasız cinsel ilişkiden sonra olabildiğince erken alınmalı ancak en geç 120 saat (5 gün) içinde alınmış olmalıdır.

4 Hap kullanırken nelere dikkat etmeliyim?

Acil doğum kontrol hapi bir miktar su ile çiğnenmeden yutulur. Aç veya tok karnına fark etmez. Hap alındıktan sonra 3 saat içinde kusulursa ikinci bir *acil doğum kontrol hapi* alınmalıdır. Kustuktan sonra aynı etken maddesi ile bir preparat alınması önemlidir. Mideniz hassassa bulantı ve kusmayı önlemek için hapi alırken örneğın bir parça ekmek yiyebilirsiniz (bakınız soru 9). Uygulama öncesinde, her ilaçta olduđu gibi prospektüs dikkatle okunmalıdır.

5 Acil doğum kontrol hapi her durumda gebeliđi önler mi?

Hayır. Hiçbir *acil doğum kontrol hapi* gebeliđi yüzde 100 önlemez ancak yüksek bir ihtimalle önler. Gebelik, ancak yumurtlama henüz gerçekleşmediyse önlenebilir.

i Hiçbir *acil doğum kontrol hapi* %100 güvenli değildir

6 Acil doğum kontrol hapının etki ettiğinden nasıl emin olurum?

Etkinlik durumunda regl döngünüze uygun tarihte ve normal yoğunlukta regl olursunuz. Bazı durumlarda adet birkaç gün daha erken veya daha geç görülebilir. Regliniz beklenen tarihten 5 sonra gelirse ya da alışılmadık biçimde az ya da yoğun ise bir gebelik testi yapılması veya kadın doğum doktoruna görünülmesi tavsiye edilir.

7 *Acil doğum kontrol hapı oluşmuş bir gebeliği sonlandırabilir mi?*

Acil doğum kontrol hapı düşük hapı değildir! Zamanında alındığında yumurtlamayı geciktirerek gebeliği önleyebilir ancak gebeliği sonlandırmaz.

i *Acil doğum kontrol hapı* düşük hapı değildir!

8 *Acil doğum kontrol hapının etkinliği olumsuz etkilenebilir mi?*

Hap aldıktan sonra kusulursa evet (bakınız soru 4). Ayrıca ör. epilepsi ya da HIV enfeksiyonu, bakteriyel enfeksiyon için olan ilaçlar ya da kılıç otu veya siklosporin içeren preparatlar da *acil doğum kontrol hapının* etkinliğini azaltabilir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri doktorunuz ya da eczacınızdan ve prospektüsten öğrenebilirsiniz. Alkol veya nikotin *acil doğum kontrol hapının* etkinliğini olumsuz etkilemez.

9 *Acil doğum kontrol hapının yan etkileri var mıdır? Varsa hangileridir?*

Hap aldıktan sonra baş dönmesi, baş ağrısı, kusma, göğüste sıkışma ya da kanlı akıntı görülebilir. Kusulursa (bakınız soru 4) ikinci bir *acil doğum kontrol hapı alınmalıdır*. Bu tür ve/veya başka yan etkiler görülürse ve uzun süre devam ederse lütfen kadın doğum doktorunuzu ziyaret edin.

10 *Acil doğum kontrol hapı gebe kalmamı ne kadar süreyle engeller?*

Acil doğum kontrol hapı, hap alındıktan sonra yaşanan korunmasız cinsel ilişkide kalıcı koruma sağlamaz. Düzenli olarak doğum kontrol hapı alan kadınlar da sonraki regl döngülerine kadar mutlaka bir koruyucu yöntem kullanmalıdır, ör. bir kondom. Önemli: *Acil doğum kontrol hapı*, genel olarak cinsel yolla bulaşan hastalıklardan da korumaz.

11 *Acil doğum kontrol hapı alarak kısır kalabilir miyim?*

Hayır, doğurganlığınız bundan etkilenmez. İleriki bir zamanda çocuk planlıyorsanız bu durum daha önce alınan bir *acil doğum kontrol hapı* nedeniyle engellenmez.

i *Acil doğum kontrol hapı* kısır yapmaz

12 Acil doğum kontrol hapı düzenli korunma yöntemlerinin yerine kullanılabilir mi?

Hayır, *acil doğum kontrol hapı* düzenli bir korunma aracı değildir! Yalnızca istisnai durumda kullanılır ve ör. düzenli alınan doğum kontrol hapları ya da kondom gibi bilinen korunma yöntemlerinin yerine kullanılmaz. Size uygun korunma yöntemi için kadın doğum doktorunuz yardımcı olabilir.

13 Acil doğum kontrol hapı aldıktan sonra emzirmeye devam edebilir miyim?

Emziren kadınların, *acil doğum kontrol hapı* aldıktan sonra emzirmeye ara vermeleri önerilir. Levonorgestrel etken maddesi içeren preparatlarda emzirmeye sekiz saat ara verilmelidir, Ulipristal asetat alımında ise bir hafta ara verilmesi önerilir.

14 Acil doğum kontrol hapının fiyatı nedir ve sağlık sigortam bunu karşılar mı?

Levonorgestrel etken maddesini içeren *acil doğum kontrol hapı*, genel olarak 23 Euro'dan düşük bir fiyata satışa sunulur. Ulipristal asetat etken maddesini içeren acil korunma aracı ise daha yüksek fiyatlıdır. Ancak eczaneler arasında fiyatlar farklılık gösterebilir. 22 yaş altı kadınlar acil durumda korunma masrafını sağlık sigortalarına ödetebilir. Ancak bunun için doktor reçetesi gereklidir.

Faydalı linkler ve iletişim bilgileri:

Nöbetçi eczaneler:

www.aponet.de/service/notdienstapotheke-finden

Ruhsal yardım hattı:

0800/111 0 111 ya da 0800/111 0 222

pro familia bilgi hattı:

01805 - 776326 (0,14 Euro/dakika)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung:

<http://www.bzga.de/infomaterialien/familienplanung/verhuetung/die-pille-danach-faltblatt/>